



IPSS - International Prostatic Symptoms Score

Nome e Cognome _____ Data di compilazione ___ / ___ / _____

	Nessuna volta	Meno di una volta su 5	Meno della metà delle volte	Circa la metà delle volte	Più della metà delle volte	Quasi sempre
1) Quante volte nell'ultimo mese ha avvertito un senso di incompleto svuotamento vescicale al termine della minzione?	0	1	2	3	4	5
2) Nell'ultimo mese quante volte ha urinato meno di due ore dopo l'ultima minzione?	0	1	2	3	4	5
3) Nell'ultimo mese Le è mai capitato di dover mingere in più tempi?	0	1	2	3	4	5
4) Nell'ultimo mese quante volte ha avuto difficoltà a posporre la minzione?	0	1	2	3	4	5
5) Nell'ultimo mese quanto spesso il getto urinario Le è parso debole?	0	1	2	3	4	5
6) Quante volte nell'ultimo mese ha dovuto sforzarsi per iniziare ad urinare?	0	1	2	3	4	5
	Mai	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte	Cinque volte
7) Nel corso dell'ultimo mese, quante volte si è alzato per andare ad urinare la notte?	0	1	2	3	4	5

Il vostro punteggio totale =

Legenda:

da 0 a 7 punti sintomatologia lieve

da 8 a 19 punti sintomatologia moderata

da 20 a 35 sintomatologia severa

Bibliografia:

Barry MJ, Fowler FJ Jr, O'Leary MP, Bruskewitz RC, Holtgrewe HL, Mebust WK, Cockett AT. The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. The Measurement Committee of the American Urological Association. Journal of Urology 1992. Nov;148(5):1549-57.